


# Anaphylaktischer Schock

Freigegeben ab: Notfallsanitäter (NKV) – Arzneimittelliste 1 (2)



<p style="text-align: center;"><b>Anaphylaktischer Schock</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A – Atemwege frei/<b>gefährdet</b> (Schwellung im Gesicht/Mund und Rachenraum)</li> <li>B – erhöhte AF und AZV, Atemnot, <b>Bronchospasmus, Stridor</b></li> <li>C – <b>erhöhte HF, niedriger RR, verlängerte Rekap</b>, blasse, schweißige und kühle Haut, Zyanose</li> <li>D – Bewusstseinsstörungen</li> <li>E – Unruhe, Juckreiz, Schwindel, Angst, Übelkeit, Erbrechen, Harn-, Stuhlabgang, <b>Hautreaktion</b> (Rötung, Ödeme, Quaddeln)</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Monitoring/Verlaufskontrolle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Subjektive Veränderungen besser/schlechter?</li> <li>Bewusstseinslage (WASB/AVPU)</li> <li>siehe A-BCDE-Schema</li> <li>Kontrolle durchgeführter Maßnahmen</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Kontraindikation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Engwinkelglaukom</li> <li>Technisch (i.v. Zugang): Kind &lt; 8 Jahre</li> <li>Kind &lt; 15 kg</li> <li>keine zuverlässige (Fremd-) Anamnese möglich</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Patienteninformation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufklärung über Maßnahme</li> <li>Einverständnis einholen oder zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Spezialität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NFS:</b> <b>EpiPen</b> – i.m. Gabe (M. vastus lateralis) Dosierung Erwachsener: 0,3 mg (&gt; 30 kg) Dosierung Kind: 0,15 mg (15 – 30 kg) einmalig wiederholbar</li> <li><b>NKV:</b> <b>1. Suprarenin</b> – i.m. Gabe (M. vastus lateralis) Dosierung Erwachsener: 0,5 mg (=0,5 ml) (&gt; 30 kg) Dosierung Kind: 0,3 mg (=0,3 ml) (15 – 30 kg) einmalig wiederholbar (nach 5 Min.) keine Verzögerung der Adrenalin-Gabe wegen i.v. Zugang <b>2. Isotone kristalloide Lösung</b> – i.v. Gabe Dosierung Erwachsener: 500 ml Dosierung Kind: 250 ml <b>3. H1 – Antihistaminikum:</b> <b>Dibondrin</b> (30 mg/2 ml) – langsame i.v. Gabe Dosierung &gt; 8 Jahre und Erwachsener: 30 mg <b>Fenistil</b> (4 mg/4 ml) – langsame i.v. Gabe Dosierung Erwachsener: 4 mg</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbesserung des Beschwerdebildes</li> <li>Anstieg des RR</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Notarzt/Transport</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten</li> </ul>