


Bestehender zerebraler Krampfanfall – Kind < 40 kg

Freigegeben ab: Notfallsanitäter (NKV) – Arzneimittelliste 1 (2)



Bestehender zerebraler Krampfanfall

- A – Atemwege frei/gefährdet
- B – unregelmäßige, flache Atmung, passagerer Atemstillstand, Zyanose
- C – erhöhte HF, verlängerte Rekap, kühle, blasse und/oder schweißige Haut
- D – **Bewusstseinsstörungen**
- E – (blutiger) Zungenbiss, **tonisch-klonische Krämpfe**, Harn- und/oder Stuhlabgang

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderungen
besser/schlechter?
- Bewusstseinslage (WASB/AVPU)
- siehe A_cBCDE-Schema
- Kontrolle durchgeführter Maßnahmen

Kontraindikation

- bekannte Unverträglichkeit gegen Benzodiazepine
- Kind < 1 Jahr
- keine zuverlässige (Fremd-) Anamnese möglich

Patienteninformation

- Aufklärung über Maßnahme
- Nebenwirkungen: Atemdepression, Abfall des RR, Schwindel
- Einverständnis einholen oder zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Spezialität

- **NFS:**
Stesolid – rektale Gabe
Dosierung (1 – 3 Jahre): 5 mg
Dosierung (3 Jahre – 40 kg): 10 mg
- **NKV:**
Wenn rektal **nicht** möglich: (off label use!)
Midazolam (5 mg/ml) – nasale Gabe
Dosierung: 5 mg via MAD = 0,5 ml/Nasenloch
Einmalgabe

Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle

- Sistieren des Krampfanfalles

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten