


Allergische Reaktion

Freigegeben ab: Notfallsanitäter NKV – Arzneimittelliste 2



Allergische Reaktion
<ul style="list-style-type: none"> A – Atemwege frei/gefährdet B – erhöhte AF C – erhöhte HF D – wach E – Juckreiz, Übelkeit, Unruhe, Schwindel, Angst, Hautreaktion (Rötung, Ödeme, Quaddeln)

Monitoring/Verlaufskontrolle
<ul style="list-style-type: none"> Subjektive Veränderungen besser/schlechter? Bewusstseinslage (WASB/AVPU) siehe A_cBCDE-Schema Kontrolle durchgeführter Maßnahmen

Kontraindikation
<ul style="list-style-type: none"> bekannte Unverträglichkeit gegenüber Spezialität Schwangerschaft/Stillzeit bekannte Epilepsie Technisch (i.v. Zugang): Kinder < 8 Jahre keine zuverlässige (Fremd-) Anamnese möglich

Patienteninformation
<ul style="list-style-type: none"> Aufklärung über Maßnahme Nebenwirkungen: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Blutdruckabfall Einverständnis einholen oder zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Spezialität
<ul style="list-style-type: none"> Dibondrin (30 mg/2 ml) – langsame i.v. Gabe Dosierung > 8 Jahre und Erwachsener: 30 mg Fenistil (4 mg/4 ml) – langsame i.v. Gabe Dosierung Erwachsener: 4 mg Isotone kristalloide Lösung – i.v. Gabe Dosierung Erwachsener: 500 ml Dosierung Kind: 250 ml

Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle
<ul style="list-style-type: none"> Verbesserung des Beschwerdebildes

Notarzt/Transport
<ul style="list-style-type: none"> Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten