



Hypertensiver Notfall

Freigegeben ab: Notfallsanitäter NKV – Arzneimittelliste 2



Hypertensiver Notfall

- A – Atemwege frei
- B – Atemnot
- C – $RR_{\text{sys}} \geq 200 \text{ mmHg}$
- D – Bewusstseinsstörungen
- E – **Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen, Nasenbluten**

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderungen besser/schlechter?
- Bewusstseinslage (WASB/AVPU)
- siehe A-BCDE-Schema
- Kontrolle durchgeführter Maßnahmen

Kontraindikation

- bekannte Unverträglichkeit gegen Urapidil
- Zeichen eines Schlaganfalls
- Akutes Koronarsyndrom
- bekannte Aortenklappenstenose
- Technisch (i.v. Zugang): Kind < 8 Jahre
- keine zuverlässige (Fremd-) Anamnese möglich

Patienteninformation

- Aufklärung über Maßnahme
- Nebenwirkungen: Rascher RR Abfall, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit
- Einverständnis einholen oder zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Spezialität

- **Ebrantil** (25 mg/5 ml oder 50 mg/10 ml) – i.v. Gabe
Dosierung: 5 mg (=1 ml) alle 3 Minuten
Maximal 25 mg
- **Tachyben** (25 mg/5 ml oder 50 mg/10 ml) – i.v. Gabe
Dosierung: 5 mg (=1 ml) alle 3 Minuten
Maximal 25 mg
- **Hypotrit** (5 mg/ml) – i.v. Gabe
Dosierung: 5 mg (=1 ml) alle 3 Minuten
Maximal 25 mg
- **Isotone kristalloide Lösung** – langsame i.v. Gabe
Dosierung: offenhaltende Flussrate

Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle

- Blutdrucksenkung nicht unter $RR_{\text{sys}} 160 \text{ mmHg}$
- Verbesserung des Beschwerdebildes

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten