



Opiatintoxikation mit Atemstörung

Freigegeben ab: Notfallsanitäter NKV – Arzneimittelliste 2



Opiatintoxikation mit Atemstörung

- A – Atemwege frei/gefährdet
- B – **AF < 8 AZ/min**, vermindertes SpO₂, **Zyanose**
- C – verlängerte Rekap, RR-Schwankungen
- D – **Bewusstseinsstörung, stecknadelkopfgroße Pupillen**
- E – Übelkeit, Erbrechen, Unruhe, Hypothermie, Tremor

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderungen besser/schlechter?
- Bewusstseinslage (WASB/AVPU)
- siehe A-BCDE-Schema
- Kontrolle durchgeführter Maßnahmen

Kontraindikation

- Kind: Technisch (i.v. Zugang) < 8 Jahre
keine zuverlässige (Fremd-) Anamnese möglich

Patienteninformation

- Aufklärung (Angehörige) über Maßnahme
- Einverständnis einholen oder zuverlässige (Fremd-) Anamnese erheben

Spezialität

- **Naloxon** (0,4 mg/ml) – titrierende i.v. Gabe
0,4 mg auf 10 ml NaCl verdünnen
Dosierung: max. 0,2 mg (=5 ml)
einmalig wiederholbar - nach 15 min
- **Isotone kristalloide Lösung** – langsame i.v. Gabe
Dosierung: offenhaltende Flussrate
- i.v. Zugang **nicht** möglich: (off label use!)
Naloxon – nasale Gabe
Dosierung: 0,2 mg (=0,5 ml) via MAD
einmalig wiederholbar

Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle

- Suffiziente Atmung
- evtl. Verbesserung des Bewusstseinszustandes

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten