


Kardiales Lungenödem

Freigegeben ab: Notfallsanitäter NKV – Arzneimittelliste 2



Kardiales Lungenödem

- A – Atemwege frei
- B – Hustenreiz, erhöhte AF, verminderte SpO₂, **Atemnot, Atemgeräusch: Brodeln**
- C – erhöhte oder niedrige HF, blasse/zyanotische, schweißige/kühle Haut, Herzrhythmusstörungen
- D – Bewusstseinsstörung
- E – Unruhe, Angst

Monitoring/Verlaufskontrolle

- Subjektive Veränderungen besser/schlechter?
- Bewusstseinslage (WASB/AVPU)
- siehe A-BCDE-Schema
- Kontrolle durchgeführter Maßnahmen

Kontraindikation

- RR_{sys} < 130 mmHg
- Einnahme von Phosphodiesterasehemmern (Viagra, Levitra, Cialis, Spedra) innerhalb der letzten 48 Stunden
- Einnahme von Medikamenten gegen Lungenhochdruck
- bekannte Unverträglichkeit gegen Nitro-Präparate
- kein i.v. Zugang möglich

Patienteninformation

- Aufklärung über Maßnahme
- Nebenwirkungen: Rascher Abfall des RR, Kopfschmerzen, Wärmegefühl, Gesichtsrötung
- Einverständnis einholen

Spezialität

- **i.v. Zugang setzen**
Dosierung: Zugang spülen
keine weitere Flüssigkeitsgabe
- **Nitrolingual Pumpspray** – sublinguale Gabe
Dosierung: 1 Hub
einmalig wiederholbar

Zustandsverbesserung/Erfolgskontrolle

- Verbesserung des Beschwerdebildes

Notarzt/Transport

- Bei kritisch kranken oder verletzten Personen frühzeitig ein höherwertiges Rettungsmittel oder den Notarzt nachalarmieren und den Transport einleiten